

殺虫剤

登録番号 第20056号

# トアロー<sup>®</sup>フロアブルCT

(BT水和剤)



- 有効成分 バチルス チューリンゲンシス菌の産生する結晶毒素 7.0%
- 性 状 淡褐色水和性粘稠懸濁液体
- 毒 性 普通物
- 有効年限 3 年
- 包 装 500 ml × 20本 / ケース

## 【特 長】

1. BT菌の中でもコナガに対して殺虫活性の高いクスターキ株を使用しているため、コナガに対して確実な効果が得られます。
2. フロアブル化により希釈液の調製が容易になるとともに、希釈液中の結晶毒素の分散性が向上し、作物に均一に付着します。
3. 水産動植物、鳥類に対して毒性が低く、クモ、寄生蜂などの天敵にも影響を与えません。
4. 有機農産物の日本農林規格（有機JAS）別表2に適合する農薬です。

## 【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	BTを含む 農薬の 総使用回数
野 菜 類	アオムシ コナガ	1000~2000	発生初期 但し 収穫前日まで	-	散布	-
	オオタバコガ	500~1000				
のざわな	ヨトウムシ	500	発生初期	-	-	
さくら	アメリカシロヒトリ	1000				
つばき類	チャドクガ					
芝	シバツトガ スジキリヨトウ	500~1000			1m <sup>2</sup> 当り 0.3ℓ 散布	

## 【使用上の注意】



1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 散布液調製時には、使用直前に容器をよく振ってください。
3. 使用に当たっては、展着剤を加用してください。
4. 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
5. 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性の強い薬剤とは混用しないでください。
6. 若齢幼虫に有効なので、若齢幼虫期に時期を失せず散布してください。

7. 蚕に対する毒性があるので、養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では使用しないでください。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないよう、風向きなどに十分注意して散布してください。なお、使用に当たっては、散布地域の使用規制に従ってください。特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。
8. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。
9. 誤飲に注意してください。もし誤って飲み込んだ場合は吐き出した上、医師の診察を受けてください。
10. 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
11. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
12. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
13. 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

### **【貯蔵上の注意】**

直射日光をさげ、食品と区別して、なるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。