

殺ダニ剤

登録番号 第21237号

ダニメツ[®]フロアブル

(エトキサゾール・オレイン酸ナトリウム水和剤)



- 有効成分 エトキサゾール 5.0% オレイン酸ナトリウム 2.0%
- 性状 類白色水和性粘稠懸濁液体
- 毒性 普通物
- 有効年限 3 年
- 包装 500ml×20本/ケース

[特 長]

1. 卵及び幼若虫に対する効果が高いため、成虫の密度が低い時期に散布すると効果的です。
2. 成虫が産んだ卵はふ化しないため、優れた残効性を示します。
3. 天敵・有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。

[適用害虫と使用方法]

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (10a当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトキサゾール を含む農薬の 総使用回数	オレイン酸ナトリウム を含む農薬の 総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ	1000	200~700 ℓ	収穫21日 前まで	2回以内	散布	2回以内	-
りんご	ハダニ類			収穫14日 前まで				
ななし			150~350 ℓ	収穫前日 まで				
きゅうり いちご				1回	1回			
茶	カンザワハダニ	200~400 ℓ	摘採14日 前まで	1回				

[上手な使い方]

ボルドー液との近接散布については下記の事項を厳守してください。

(ICボルドーもボルドー液と同様に扱ってください。)

- ①本剤を散布した後にボルドー液を使用する場合は2週間以上の散布間隔をあけてください。
- ②ボルドー液を散布した後に本剤を使用する場合は2ヶ月以上あけて散布してください。

[使用上の注意]

1. 貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
2. アルカリ性剤のため、他の薬剤との混用または近接散布には注意してください。
3. ボルドー液との混用はさけてください。
4. 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。

5. 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
6. ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないようにていねいに散布してください。
7. ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、できるだけ年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
8. 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
9. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
10. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗い、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼をしてください。
11. 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
12. 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

【貯蔵上の注意】

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。