

殺菌剤

登録番号 第22627号

オーシャインフロアブル

(オキシポコナゾールフマル酸塩水和剤)



- 有効成分 オキシポコナゾールフマル酸塩 20.0%
- 性状 類白色水和性粘稠懸濁液体
- 毒性 普通物
- 有効年限 5 年
- 包装 500ml×20本/ケース

【特 長】

1. 広い殺菌スペクトラムを持ち、病害の同時防除が可能です。
2. 予防、治療効果の両作用を持ち、散布適期幅が広いDMI剤です。
3. 果面の汚れが少なく安心して使用できます。
4. 有用昆虫、天敵に対して安全性の高い殺菌剤です。

【適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (10a当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	オキシポコナゾールフマル酸塩 を含む農薬の総使用回数	
りんご	うどんこ病	2000～ 3000	200～700 ℓ	収穫7日 前まで	5回以内	散布	5回以内	
	赤星病							
黒星病	2000	収穫前日 まで		3回以内	3回以内			
モニリア病								
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病	3000		収穫前日 まで	3回以内			3回以内
みかん	そうか病							
	貯蔵病害 (緑かび病)							
おうとう	灰星病	3000		収穫前日 まで	3回以内			3回以内
	幼果菌核病							
小粒核果類 (うめを除く)	褐色せん孔病	2000～ 3000		収穫前日 まで	3回以内			3回以内
	灰星病							
うめ	黒星病	2000～ 3000	収穫前日 まで	3回以内	3回以内			
	すす斑病							
	灰星病							
もも	灰星病	2000～ 3000	収穫前日 まで	3回以内	3回以内			
	黒星病							
ネクタリン	ホモブシ腐敗病	1000～2000	収穫前日 まで	3回以内	3回以内			
	灰星病	2000～ 3000						
	黒星病							
ネクタリン	ホモブシ腐敗病	2000	収穫前日 まで	3回以内	3回以内			
	ホモブシ腐敗病	2000						

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (10a当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	オキシポコナゾールフルマドニルを含む農薬の総使用回数
ぶどう	うどんこ病 灰色かび病 黒とう病 褐斑病	2000	200~700 ℓ	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
なし	黒星病 赤星病	3000		収穫前日 まで	5回以内		5回以内

【上手な使い方】

ぶどうに使用する場合、萌芽直後～新葉展開初期に高濃度で散布すると葉に薬害を生じるおそれがあるので使用濃度を厳守してください。

【使用上の注意】

1. 使用前によく振ってから使用してください。
2. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
3. 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
4. ぶどうで使用する場合、無袋栽培では果実肥大中期(大豆大)以降、有袋栽培では果実肥大中期(大豆大)から袋かけ前までの散布は、果粉の溶脱が生じることがあるので注意してください。
5. 周辺の作物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。
6. 空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
7. 使用に当たっては、所定の希釈倍数を厳守し、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。
8. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。
9. 誤飲、誤食などのないよう注意してください。
10. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。

【貯蔵上の注意】

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。