

令和3年10月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が令和3年10月19日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル (第21056号)
有効成分・% : トルフェンピラド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.0%

登録年月日 : 令和3年10月19日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名の追加 : カリフラワー／コナガ
- ・ 作物名の追加 : しょくようほおずき／コナジラミ類

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
なし	アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、クワコナカイガラムシ	2000倍	200～700 L/10a	収穫 30 日前まで	1 回	散布	1 回
なし(苗木)	アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類	2000倍	100～700 L/10a	育苗期	2回以内		2回以内
かんきつ	ミカンサビダニ	2000～3000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで			
	アブラムシ類、チャノホコリダニ、カネタタキ	2000倍					
	アザミウマ類	1000～2000倍					
	ゴマダラカミキリ、コナカイガラムシ類、コナジラミ類、ミカンキジラミ、ヨモギエダシャク、ヨコバイ類、ミカンバエ成虫	1000倍					
すもも	アブラムシ類	2000倍	200～700 L/10a	収穫14日前まで			
もも ネクタリン	シンクイムシ類	1000～2000倍		収穫前日まで			
	アブラムシ類、モモハモグリガ、モモサビダニ	2000倍		成虫発生期但し、収穫前日まで			
	アザミウマ類	1000倍					
	クビアカツヤカミキリ						
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで			
	うどんこ病						
キャベツ	コナガ、アオムシ、アブラムシ類、ハイマダラノメイガ、アザミウマ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで			
はくさい	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、キスジノミハムシ、ダイコンサルハムシ、ナメクジ類						
		アブラムシ類	1000～2000倍				
レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで			
	ヒメフタテンヨコバイ、ナメクジ類	1000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数	
非結球レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回	
セルリー				収穫30日前まで	2回以内		2回以内	
カリフラワー	コナガ	1000倍		収穫3日前まで				
いちご	アブラムシ類、アザミウマ類、カキノヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、クロバネキノコバエ類、うどんこ病	1000倍		1番花の開花まで	1回		1回	
すいか	アブラムシ類	1000～2000倍		1000～800 L/10a	収穫前日まで		2回以内	2回以内
	アザミウマ類、うどんこ病							
アスパラガス	ネギアザミウマ、アブラムシ類、コナジラミ類、ジュウシホシクビナガハムシ、ツマグロアオカスミカメ	1000倍	100～300 L/10a	2回以内	2回以内			
しょくようほおずき	コナジラミ類	2000倍	100～300 L/10a	1回	1回			
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ	1000～1500倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	1回	1回		
	マダラカサハラハムシ、チャトゲコナジラミ	1000倍						
花き類・観葉植物	アザミウマ類	1000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内	4回以内		
チューリップ	アブラムシ類	1000～2000倍	300L/10a	掘取後～植付前	3回以内			
	チューリップサビダニ	500倍	—	掘取後～植付前	1回	15分間球根浸漬		

