

ダニレゾジャー®DC

しつこいハダニに
するどい一撃!



リンゴハダニ



ナミハダニ

特長

1. 即効性に優れる殺ダニ剤です。
2. ハダニの全てのステージ（卵、幼虫、若虫、成虫）に対して効果があります。
3. ハダニの天敵であるカブリダニや、有用昆虫であるミツバチに対して影響が少ないです。
4. 収穫前日まで使える「使い勝手のよい薬剤」です。

殺虫剤分類 25A

農林水産省登録
第23591号

- 有効成分：シフルメトフェン10.0%
- 毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
- 有効年限：5年
- 危険物表示：第4類第三石油類
- 包装：500mℓ×20本/ケース

適用害虫と使用方法

2020年8月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(10a当り)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シフルメトフェンを含む 農薬の総使用回数
りんご	ハダニ類	1000	200~700ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内

上手な使い方

浸透移行性や浸達性（葉の表から裏へ薬剤が移行すること）、ガス効果は期待できません。従って、散布ムラがあると効果が不安定になることが想定されますので、ていねいに散布してください。

⚠ 使用上の注意事項

- 使用前には容器を良く振り、使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないようにていねいに散布してください。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、できるだけ年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- ボルドー液との混用はさけてください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 誤飲などのないよう注意してください。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の処置を受けてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の処置を受けてください。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の処置を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。
- 危険物第4類第三石油類（水溶性液体）に属するので火気には十分注意してください。

貯蔵上の注意事項

- 火気をさけ、食品と区別して直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ● 防除日誌を記帳しましょう。

®はOATアグリオ(株)の登録商標

取扱い

OAT アグリオ株式会社
<https://www.oat-agrio.co.jp/>
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター：☎0120-210-928 (9:00~12:00, 13:00~17:00)
土・日・祝日をのぞく

2008TS