



しぶといハダニは サラバでござる!!

殺ダニ剤

ダニサラバ[®] フロアブル



•ナミハダニ

•ミカンハダニ

•カンザワハダニ

•リンゴハダニ

殺虫剤分類 25A

®はOATアグリオ株式会社の登録商標です。

●有効成分名: シフルメトフェン----20.0%
●毒 性: 普通物(毒物に該当しないものを指す通称)



ダニサラバの詳しい情報は
こちらからアクセス!

殺ダニ剤

ダニサラバ® フロアブル

特長

- ①既存の殺ダニ剤と異なる新規骨格を有する殺ダニ剤です。
- ②既存剤に対して感受性の低下したハダニ類にも有効です。
- ③ナミハダニ、カンザワハダニ等の*Tetranychus*属、ミカンハダニ、リンゴハダニ等の*Panonychus*属の両属に有効で、全ての発育ステージ(卵、幼虫、若虫、成虫)に対して活性を有し、特に若幼虫に対して優れた効果を示します。
- ④優れた残効性を示します。
- ⑤ハダニの天敵であるカブリダニやその他の天敵、有用昆虫であるミツバチ、マメコバチ等に対して影響が小さくIPM(総合的病害虫管理)に適しています。

●適用害虫及び使用方法

2024年5月現在の登録内容

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 (倍) | 使用液量 (10a当たり) | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | シフルメトフェンを含む 農薬の総使用回数 | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------|-------------|------|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| かんきつ | ミカンハダニ | 1000~2000 | 200~1000ℓ | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | | | | | | |
| りんご | ハダニ類 | 1000 | 200~700ℓ | | | | | | | | | | |
| ぶどう | ハダニ類 ブドウヒメハダニ | | 収穫14日前まで | | | | | | | | | | |
| びわ、かき | | 1000~2000 | | | | | | 1000 | | | | | |
| なし、もも ネクタリン とうとう 小粒核果類 いちじく | | | 収穫前日まで | | | | | | | | | | |
| ホップ | | 2000 | | | | | | 100~350ℓ | | | | | |
| すいか、メロン きゅうり、いちご なす、ピーマン やまいも モロヘイヤ みょうが(花穂) みつば さやいんげん かんしょ | | | 収穫14日前まで | | | | | | | | | | |
| しそ科葉菜類 なんてん(葉) てんさい | | 1000 | | | | | | 100~350ℓ | | | | | |
| みょうが(茎葉) | | | 収穫7日前まで | | | | | | | | | | |
| 食用ぎく とうがん アスパラガス | | 100~500ℓ | | | | | | 100~500ℓ | | | | | |
| 茶 花き類・観葉植物 | カンザワハダニ ハダニ類 | 1000~2000 1000 | | | | | | 200~400ℓ 100~350ℓ | | | | | |
| ※ナミハダニ成虫に対し遅効的な事例があり散布後1週間以上残る場合がありますが、卵やふ化幼虫に優れた持続性を示すことで防除効果を発揮します。 | | | | | | | | | | | | | |

△ 使用上の注意



- 使用前には必ず容器を振り、使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないようにていねいに散布してください。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいので、できるだけ年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- ボルドー液との混用はさけてください。(またボルドー液との近接散布は14日以上間隔をあけてください。)
- ぶどうに使用する場合、無袋栽培においては果粉溶脱のおそれがあるため果実肥大期(大豆粒大)以降の散布はさけてください。
- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空容器等は圃場等に放置せず適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

● 適用作物群に属する作物又はその新品种に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

● 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

● 敷設の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

● 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

● かぶれやすい体质の人は取扱に十分注意してください。

貯蔵上の注意
直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。



OAT アグリオ株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

<https://www.oat-agrio.co.jp/>

コールセンター: ☎ 0120-210-928 (9:00~12:00・13:00~17:00)
土・日・祝日を除く