

朝まけば、その日にわかる!

# 即日除草 プリグロックス<sup>®</sup>L



イオンの力で、雑草の細胞を破壊!

- スギナも撃退、芯まで枯れる!
- 土壌生物に影響が少ない!
- 気温が低くても効果が安定!



## プリグロックス<sup>®</sup>L

**安全な登録農薬を使いましょう! 安全使用推進運動展開中**

きちんと。ただし。農薬は必ずカギをかけて保管しましょう。ラベルをよく読んで正しく使いましょう。

農薬をご使用の際は、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。

®はシンジェンタ社の登録商標



- スギナも撃退、芯まで枯れる!
- 土壌生物に影響が少ない!
- 気温が低くても効果が安定!



適用作物及び適用場所・雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	バラコートを含まない農薬の総使用回数
				薬量 (mL/10a)	希釈水量 (L/10a)				
移植水稻	-	一年生雑草	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで	800~1000	100~150	1回	1回	1回	
直播水稻			秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前14日~は種後7日(イネ出芽前)	600~1000					
麦類	圃場内の周縁部	多年生雑草	は種前又はは種後出芽前	1000~2000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
さとうきび			雑草生育期						
未成熟とうもろこし	-	一年生雑草	雑草生育期	600~1000	4回以内	4回以内	4回以内	4回以内	4回以内
とうもろこし(子実)			雑草生育期						
豆類(種実、ただし、だいず、わかせいを除く)	-	一年生雑草	は種前又は種付前	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
だいず			雑草生育期						
いも類(ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにやく、みずいもを除く)	-	一年生雑草	種付前	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
えだまめ			雑草生育期						
ばれいしょ	-	一年生雑草	萌芽直前	400~600	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
かんしょやまのいも			雑草生育期	400~600					
さといも	-	一年生雑草	種付前	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
こんにやく			雑草生育期						
果樹類(かんきつを除く)	-	一年生雑草	種付後から萌芽直前	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
かんきつ			雑草生育期						
いちご	-	一年生雑草	種付前又は種付前	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
野菜類(レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、はうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、うど、やまのいも(むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く)			雑草生育期						

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	バラコートを含まない農薬の総使用回数
				薬量 (mL/10a)	希釈水量 (L/10a)				
キャベツ	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
カリフラワー			種間処理: 雑草生育期						
トマト	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
きゅうり			種間処理: 雑草生育期						
はうれんそう	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
ピーマン			種間処理: 雑草生育期						
かぼちゃ	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
はくさい			種間処理: 雑草生育期						
ブロッコリー	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
レタス			種間処理: 雑草生育期						
たまねぎ	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
ねぎ			種間処理: 雑草生育期						
にんじん	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
なす			種間処理: 雑草生育期						
すいか	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
メロン			種間処理: 雑草生育期						
しょうが	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
にんにく			種間処理: 雑草生育期						
アスパラガス	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
スギナ			種間処理: 雑草生育期						
ふき	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
みょうが(花穂)			種間処理: 雑草生育期						
みょうが(茎葉)	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
うど			種間処理: 雑草生育期						
ほとむぎ	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
ハセリ			種間処理: 雑草生育期						
やまのいも(むかご)	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
たけのこ			種間処理: 雑草生育期						
茶	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
桑			種間処理: 雑草生育期						
たばこ	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
チューリップ			種間処理: 雑草生育期						
花き類・観葉植物(チューリップ、すいせんを除く)	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
すいせん			種間処理: 雑草生育期						
樹木類	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
水田作物(休耕田)			種間処理: 雑草生育期						
水田作物(水田畦畔)	-	一年生雑草	種間処理: 雑草生育期	600~1000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
樹木等			種間処理: 雑草生育期						

作物名	使用目的	使用薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	バラコートを含まない農薬の総使用回数
チューリップ	ウイルス罹病株の枯殺	1mL/株	第2葉展開期から開花20日後まで	1回/罹病株	ウイルス罹病株葉への滴下	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空容器・空袋等は圃場などに放置せず適切に処理してください。 ●防除日誌を記載しましょう。



コールセンター: ☎ 0120-210-928 (9:00~12:00・13:00~17:00 土日祝日を除く)