

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が令和6年10月2日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル (第21056号)
 有効成分・% : トルフェンピラド 15.0%

登録年月日 : 令和6年10月2日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更:

- (1) 希釈倍数の変更: もも、ネクタリン/クビアカツヤカミキリ (1000倍) ⇒ (1000~2000倍)
- (2) 病害虫名の追加: カリフラワー/アブラムシ類 (1000倍)

【変更後】 (変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
カリフラワー	コナガ、アブラムシ類	1000倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
もも ネクタリン	シンクイムシ類	1000~2000倍	200~700L /10a	収穫前日まで			
	クビアカツヤカミキリ			成虫発生期 但し、収穫前日まで			
	アブラムシ類、モモハモグリガ、モモサビダニ	2000倍		収穫前日まで			
	アザミウマ類	1000倍					

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数			
なし	アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、クワコナカイガラムシ、チュウゴクナシキジラミ	2000倍	200～700 L/10a	収穫 30 日前まで	1 回	散布	1 回			
なし(苗木)	アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、チュウゴクナシキジラミ		100～700 L/10a	育苗期						
かんきつ	サビダニ類	2000～3000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	2回以内					
	アブラムシ類、チャノホコリダニ、カネタタキ	2000倍								
	アザミウマ類	1000～2000倍								
	ゴマダラカミキリ、コナカイガラムシ類、コナジラミ類、ミカンキジラミ、ヨモギエダシャク、ヨコバイ類、ミカンバエ成虫、ナメクジ類	1000倍								
すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫14日前まで						
もも ネクタリン	シンクイムシ類	1000～2000倍		収穫前日まで					2回以内	2回以内
	クビアカツヤカミキリ			成虫発生期但し、収穫前日まで						
	アブラムシ類、モモハモグリガ、モモサビダニ	2000倍		収穫前日まで						
	アザミウマ類	1000倍								
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000～2000倍		収穫前日まで						
	うどんこ病									
キャベツ	コナガ、アオムシ、アブラムシ類、ハイマダラノメイガ、アザミウマ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで						
はくさい	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ、ナメクジ類									
	アブラムシ類	1000～2000倍								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数	
レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	ヒメフタテンヨコバイ、ナメクジ類	1000倍			1回			
非結球レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	2000倍		収穫30日前まで	2回以内		1回	1回
セルリー				収穫3日前まで			2回以内	2回以内
カリフラワー	コナガ、アブラムシ類	1000倍		100～300 L/10a	1番花の開花まで		1回	1回
いちご	アブラムシ類、アザミウマ類、カキノヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、クロバネキノコバエ類、うどんこ病							
	アブラムシ類							
すいか	アザミウマ類、うどんこ病	1000倍		100～800 L/10a	収穫前日まで		2回以内	2回以内
アスパラガス	ネギアザミウマ、アブラムシ類、コナジラミ類、ジュウシホシクビナガハムシ、ツマグロアオカスミカメ							
しょくようほおずき	コナジラミ類	2000倍		100～300 L/10a				
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ	1000～1500倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	1回	1回		
	マダラカサハラハムシ、チャトゲコナジラミ	1000倍						
花き類・観葉植物	アザミウマ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内	4回以内		
チューリップ	アブラムシ類				300L/10a		3回以内	
		チューリップサビダニ	500倍	—	掘取後～植付前	1回	15分間球根浸漬	