

殺虫剤

登録番号 第18249号

オレート液剤

(オレイン酸ナトリウム液剤)



- 有効成分 オレイン酸ナトリウム 20.0%
- 性 状 淡黄色澄明液体
- 毒 性 普通物
- 有効年限 5 年
- 危険物表示 第4類第二石油類(水溶性)
- 包 装 1ℓ×12本／ケース 5ℓ×4本／ケース

【特 長】

1. 微小害虫（アブラムシ類・コナジラミ類の成幼虫）及びうどんこ病に優れた効果（即効的）を發揮します。
2. 抵抗性が発達する可能性が非常に低い（作用機作は物理的な窒息死、うどんこ病では細胞膜破壊）殺虫・殺菌剤です。
3. 有効成分であるオレイン酸ナトリウムは、オリーブ油や牛脂等に含まれる脂肪酸のナトリウム塩であり、食品添加物にも指定されている成分ですので、人畜および環境に対する影響が少ないと考えられます。
4. 適用作物が「野菜類・果樹類」と幅広い上に、収穫前日まで散布可能です。
5. 天敵、有用昆虫に対する影響の少ないことが確認されています。

【適用病害虫と使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (10a当り)	使用時期	本 剤 の 使用回数	使用 方法	オレイン酸 ナトリウムを 含む農薬の 総使用回数
果 樹 類 (なしを除く)	アブラムシ類	100	200~700 ℓ	発生初期～ 収穫前日まで	-	散布	-
な し		100~200					
野 菜 類 (いちごを除く)	コナジラミ類	100~300					
	アブラムシ類	100					
い ち ご	コナジラミ類	100~300	100~300 ℓ	発病初期～ 収穫前日まで			
	アブラムシ類	100					
うどんこ病							
き く ば ら	アブラムシ類			発生初期～ 収穫前日まで			

【上手な使い方】

1. 害虫に薬液がムラなくかかるよう、ていねいに散布してください。

【使用上の注意】

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 本葉6～7枚期までの散布は薬害の出るおそれがあるのでさけてください。
3. 高温時の散布は薬害の生じるおそれがあるのでさけてください。
4. 散布直後の降雨は効果を減ずるので、天候を見極めてから散布してください。
5. アルカリ性剤のため、他の薬剤との混用または近接散布には注意してください。
6. 病害虫の発生が多い場合は効果が十分に発揮されないこともあるので、5日前後の間隔で連続散布してください。
7. 薬害のおそれがあるので、周辺の作物にかからないように注意してください。
8. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
9. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
10. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
使用後は洗眼してください。
11. 危険物第4類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。

【貯蔵上の注意】

1. 火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。
2. 低温期には凝固することがありますが、融解後の成分に影響はありません。