

植物成長調整剤

登録番号 第24510号

ホワイトリボン

(クロルタルジメチル・デシラルコール乳剤)



- 有効成分 クロルタルジメチル [ジメチル=テトラクロロテレフタレート] 0.20%
デシラルコール 70.0%
- 性状 淡黄色澄明可乳化油状液体
- 毒性 普通物
- 有効年限 5年
- 危険物表示 第4類第三石油類・水溶性
- 包装 1ℓ×12本/ケース
- 化管法 デシラルコール(1種) 70.0%

【特長】

- クロルタルジメチルは、たばこわき芽の幼芽細胞に直接浸透し、細胞の有糸分裂を阻害することでわき芽伸長を抑制します。
- デシラルコールは、脱水作用により幼芽を枯殺します。
- わき芽抑制効果により、芽かき作業の省力化が期待できます。
- 接触型のわき芽抑制剤のため、心止後の使用においては上位葉の伸長・肥大には影響がありません。

【適用作物と使用方法】

作物名	使用目的	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルタルジメチルを含む農薬の総使用回数	デシラルコールを含む農薬の総使用回数
たばこ	わき芽抑制	30~50	20mℓ/株	心止後	2回以内	スポット散布	2回以内	6回以内

【たばこ種類別使用方法】

たばこ用農薬の使用基準 (2024年作版) より抜粋

作物名	使用目的	種類	希釈倍数(倍)	1株当り使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	デシラルコールを含む農薬の総使用回数*
たばこ	わき芽抑制	黄色種	50	20mℓ	心止後	2回以内	スポット散布	5回以内
		在来種・パーレー種						2回以内

*デシラルコール乳剤 (コンタクト) を併用する場合には、デシラルコールを含む農薬の総使用回数は、黄色種は5回以内、在来種・パーレー種は2回以内としてください。

- ・その他の注意事項については、下記「使用上の注意」をご参照ください。

【使用上の注意】

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
 2. 本剤の所要量を所定量の水にうすめ調製し、よくかき混ぜてから速やかに散布してください。
 3. 本剤は接触型のわき芽抑制剤なので、収穫葉に薬液が飛散しないように接触型専用ノズルを使用し、所定の濃度の薬液が幹に沿ってわき芽に十分接触するように散布してください。
 4. すでに大きくなったわき芽（3cm以上）には十分な効果が期待できないので、心止後なるべく早い時期に所定希釈液を散布してください。
 5. 降雨などにより散布が遅れてわき芽が伸長した場合は、大きくなったわき芽（3cm以上）を摘芽した後散布してください。
 6. 散布直後の降雨は効果が低下するおそれがあるので、降雨が予想される場合は、散布をさけてください。
 7. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
 8. 眼に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
 9. 皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 10. 危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意してください。
- ※ 使用する場合は、日本たばこ産業株式会社の指導を受けてください。

【貯蔵上の注意】

1. 火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。
2. 厳冬期には凝固することがありますが、融解後の成分に変化はありません。